



Km. 4.5 Vía Durán-Tambo
Tel. 2 815737-2 815659
Guayaquil-Ecuador

GUIA PARA EL USO DE LOS ALIMENTOS DE PARA CACHAMAS Y OTRAS ESPECIES AMAZÓNICAS

ALIMENTO	TAMAÑO DEL ALIMENTO	RANGO DE PESO DE LOS PECES	TASA DE ALIMENTACION (% peso vivo/día)	FRECUENCIAS DE ALIMENTACION	FACTOR DE CONVERSION ALIMENTICIA
CACHAMA-28%	Extruso 3 mm	20.0-50.0 g.	Aprox. 8%	3-4 veces/día	1.2-1.5: 1.0 ⁽¹⁾
	Extruso 5 mm	50.0-200.0 g.	Aprox. 7%		
CACHAMA-24%	Extruso 7 mm	200-450.0 g.	3-6 %	3 veces/día	
	Extruso 10 mm	> 450.0 g.			

⁽²⁾ Este valor es solo referencial; puede variar sustancialmente en función de otros tipos de alimentos que disponen los sistemas ó prácticas de cultivo de cada región ó país.

En la región amazónica ecuatoriana hay varios niveles de tecnología en el manejo de la producción de cachamas. Sistemas con buena tecnología cultivan los peces hasta 600 g en un tiempo de 4-4.5 meses, con densidades de 3 animales/m² alcanzando un factor de conversión de 1.0:1.0; pero, también hay sistemas de producción más sencillos, a nivel de campesinos, que cultivan los peces hasta 400 g, alcanzando este peso en 3-3.5 meses, con conversiones cercanas a 1.2:1.0.